

ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีการหกล/ กระจายออกมานอกภาชนะบรรจุของเชื้อ

1. สวมถุงมือ ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทั่วบริเวณนั้น ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที หากพื้นที่นั้นเป็นบริเวณที่กว้าง อาจจะทำให้เกิดการกระจายของเชื้อไปในอากาศได้
2. ถูพื้นด้วยผ้าฝ้ายที่ชุ่มน้ำได้ดี ผ้าขนหนู หรือกระดาษชำระ และเมื่อใช้แล้วให้กำจัดโดยนำไปในถุงพลาสติกที่สามารถใช้กับหม้อนึ่งความดันได้ (autoclave)
3. เศษเครื่องแก้วที่ตก จะต้องเก็บโดยใช้คีบคีบ (forceps) หรือที่ตักผง และแปรงปัดฝุ่นแล้วใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมสำหรับฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันได้ โดยภาชนะเหล่านั้นได้มาจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และที่สำคัญจะต้องนำเศษแก้วที่แตกนั้นไปทำการฆ่าเชื้อ และที่ตักผง แปรง หรือคีบคีบควรจะถูกฆ่าเชื้อด้วย
4. ถอดถุงมือออกและล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ

ของใช้ส่วนตัว เช่น หนังสือ กล้องดินสอและอื่น ๆ จะต้องถูกฆ่าเชื้อด้วย ถ้าหาก ว่าสิ่งของเหล่านั้นได้รับการปนเปื้อน